

La Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

Espèce protégée, ce grand échassier, plus que discret, recolonise nos massifs forestiers.

Les parties supérieures de son corps sont recouvertes de plumes noires brillantes avec des reflets irisés (la tête, le dos, le cou, le haut de la poitrine). Le reste du plumage est blanc (plumes du ventre, du bas de la poitrine, les axillaires (les aisselles) et les sous-caudales), le bec et les pattes sont rouges.

Taille : 95 à 100 cm

Envergure : 185 à 200 cm

Poids : environ 3kg



La cigogne noire occupe le nid des années précédentes. C'est un nid volumineux fait avec des matériaux trouvés sur place, composé de branches et branchettes, tapissé de mousse, d'herbe et de feuilles, amalgamées avec de la terre. Le nid se situe dans les épais bosquets de hêtres, chênes et pins proches des zones humides.

Inféodé aux grands massifs forestiers tranquilles, chaque année, le couple regagne discrètement son nid, qu'il a établi en haut d'un grand arbre. Ponte de 3 à 5 œufs à partir de fin mars début avril et envol des jeunes vers mi-juillet août.

Régime: Ruisseaux, étangs marécageux et prairies humides constituent son garde-manger , (en Ardenne, elle se nourrit notamment dans les petits cours d'eau ardennais).

Elle consomme des poissons, des batraciens, des insectes, des coquillages, des crabes, des petits reptiles, des oiseaux et des mammifères.

Les poussins plus faibles ou petits sont parfois tués par leurs parents. Cela se produit quand les ressources alimentaires se font insuffisantes, la réduction de la taille des couvées augmentant les chances de survie des autres oisillons. Les cigogneau ne s'attaquent pas entre eux, les poussins plus forts ne sont notamment pas agressifs envers les plus faibles membres de leur couvée comme c'est le cas chez certaines espèces ([cainisme](#)), et la méthode de nourrissage employée par les parents — la régurgitation de grandes quantités de nourriture à la fois sur le fond du nid — ne permet pas aux plus forts de se nourrir entièrement au détriment des plus faibles ; l'[infanticide](#) par les parents reste donc le moyen efficace de réduire la taille d'une couvée mais n'est pas souvent observé. Un cas d'infanticide a toutefois été filmé en mai 2012 sur un nid de trois juvéniles en Belgique (Ardenne)

Vous pouvez suivre la Cigogne noire par webcam via le site www.solon.be.

La population européenne est voisine de 500 couples.

Espèce répandue en Europe orientale et centrale, dans la Péninsule Ibérique, recolonise l'Europe occidentale.

Chez nous, elle niche en Ardenne, Fagne-Famenne, Condroz et probablement en Lorraine (source: biodiversite.wallonie.be)

A la fin du XIXe siècle, conséquence probable des déforestations massives, elle avait sans doute cessé de nicher dans la région Ardenne-Eifel, elle était aussi parfois la cible de chasseurs. Mais en 1989 un premier cas de nidification en Ardenne est documenté.

La Cigogne noire ne niche pas sur le plateau des Hautes Fagnes, mais en périphérie, dans les grands hêtres de l'Hertogenwald où un nid fut occupé chaque année de 1997 à 2000.

La cigogne noire est une espèce **migratrice**.

Départ en migration d'août à début octobre. La cigogne noire migre pour l'hiver vers l'[Afrique](#).

Elle emprunte le détroit de Gibraltar ou celui du Bosphore quand elle part de l'Est de l'Europe.

Les jeunes partent plus tôt que les adultes.

Dès la mi-mars, elle nous revient de l'Afrique de l'ouest, où elle y a passé tout l'hiver.

Seuls les jeunes resteraient en Afrique au cours de leur premier été.

Elle bat lentement des ailes, le cou et les pattes tendus. Vol puissant et régulier.

Elle vole dans des courants d'air chaud pour faciliter le vol sur de longues distances. Les Cigognes noires parcourent entre 200 et 300 kilomètres par jour, mais cela peut aller jusqu'à 500 kilomètres.



Malgré les différents statuts de protections, le maintien de l'étendue de nombreux massifs forestiers ainsi que la préservation des milieux naturels ou semi-naturels humides, l'espèce reste exposée à différents facteurs susceptibles de limiter l'accroissement de sa population, notamment :

- Les **dérangements** trop fréquents dus aux promeneurs et aux exploitations forestières, en période de nidification. Pendant cette période, si vous rencontrez des personnes qui s'approchent trop des nids par curiosité (promeneurs, curieux, photographes ...), je crois qu'il faut leur signaler que tout dérangement peut provoquer l'abandon de la nichée!


- La **perte des nids** par abattage de l'arbre porteur, retardant la nidification.

- La **modification des habitats**, en particulier par enrésinement des vallées forestières et humides, par le drainage de prés humides et par la pollution insidieuse des cours d'eau.

Elle peut vivre jusqu'à 20 ans.

Répartition de la Cigogne noire, en Eurasie et en Afrique

- jaune: habitat d'été
- vert: habitat permanent
- bleu: zones d'hivernage



Merci à Jean-Marie Poncelet pour les photos de la Cigogne noire .

Hubert Crahay
guide-nature mars 2013